

副作用Grade評価表

症状		Grade 1	Grade 2	Grade 3
消化器系症状	悪心 食欲不振	☐ 摂食習慣に影響のない 食欲低下	☐ 顕著な体重減少、脱水や栄養 失調を伴わない食事量の減少	☐ 顕著な体重減少、 脱水症状や栄養失調を伴う
	嘔吐	☐ 24時間に1～2回の嘔吐	☐ 24時間に3～5回の嘔吐	☐ 24時間に6回以上の嘔吐
	下痢	☐ 通常より4回/日以下の 排便回数の増加	☐ 通常より4～6回/日の 排便回数の増加	☐ 通常より7回/日以上 の排便回数の増加
	便秘	☐ 不定期または間欠的な症状	☐ 緩下剤または浣腸の定期的な 使用を要する持続的な症状	☐ 排便を要する頑固な便秘
	味覚異常	☐ 味覚の変化はあるが、食生活 は変わらない	☐ 食生活の変化を伴う味覚の 変化	—
皮膚・粘 膜症 状	発疹	☐ 体表面積の10%以下	☐ 体表面積の10～30% 身の回り以外の生活動作制限	☐ 体表面積の30%以上 身の回りの日常生活動作制限
	口内炎	☐ 症状がないまたは治療を 要さない程度	☐ 中等度の疼痛で食事の変更を 要する	☐ 高度の疼痛で経口摂取に 支障がある
	脱毛	☐ かつらやヘアピースを必要と しない	☐ かつらやヘアピースを望んで おり、心理的な影響を伴う	—
末梢・四 肢症 状	末梢神経 障害	☐ 症状がないまたは治療を 要さない程度	☐ 中程度の症状で症状が持続し 身の回り以外の生活制限	☐ 高度の症状で箸が持てない等、 身の回りの日常生活制限
	手足症候群	☐ 疼痛を伴わない皮膚の変化	☐ 疼痛を伴う皮膚の変化 身の回り以外の日常生活制限	☐ 疼痛を伴う高度な皮膚の変化 身の回りの日常生活制限
	関節痛 筋肉痛	☐ 軽度の疼痛	☐ 中程度の症状で症状が持続し 身の回り以外の生活動作制限	☐ 高度な疼痛、 身の回りの日常生活動作制限
全身症 状	発熱	☐ 38～39℃	☐ 39～40℃以上	☐ 40℃以上が24時間以上持続
	疲労/倦怠感	☐ 休息により軽快する疲労	☐ 休息により軽快せず 身の回り以外の生活動作制限	☐ 休息により軽快せず 身の回りの日常生活動作制限
	高血圧 (mmHg)	☐ 収縮期 120～139 または 拡張期 80～89	☐ 収縮期 140～159 または 拡張期 90～99	☐ 収縮期 160以上 または 拡張期 100以上
	高血糖 (mg/dL)	☐ 空腹時血糖 160以下	☐ 空腹時血糖 160～250以下	☐ 空腹時血糖 250以上 入院を要する

* Grade 2、Grade 3の副作用やそれ以外の副作用で気になることがありましたら、医師または薬剤部にご相談ください。